

મગફળીના પાકની સુરક્ષા માટે જોંધાચેદ અને ભદામણ કુટવામાં આવેલ જંતુનાશક દવાઓની યાદી

ટેકનિકલ બુલેટીન નં. ૦૧/૨૦૨૦



સંકલન :
જટરાજ વી. એમ., અનંત કુરેલલ,
રાજરામ ચૌધરી,
સાવલીયા એસ.ડી., શીરમલાઈસામી પી.પી.,
રૂપક જેના, હરીશ જી., રામ દત્તા અને
રાધાકૃષ્ણન ટી.


ભાકૃસંપ - મગફળી સંશોધન નિદેશાલય, જૂનાગઢ.

પોસ્ટ બોક્ષ નંબર-૦૫, જૂનાગઢ-૩૬૨ ૦૦૧, ગુજરાત, ભારત.

મગફળીના પાકની સુરક્ષા માટે નોંધાયેલ અને ભલામણ કરવામાં આવેલ જંતુનાશ દવાઓની યાદી

રોગો, છવ-જંતુ, સુન્ઝમી અને નીંદણ જેવા જૈવિક પરીભ્રમો મગફળીના ઉત્પાદનને અસર કરે છે અને ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો કરે છે. આ જૈવિક પરીભ્રમોને સંચાલન કરવા માટે, કેટલાંક જંતુનાશકો જરૂરી છે. સાચી માહિતીની ગેરહાજરીમાં, ખેડૂતો સરળતાથી ઉપલબ્ધ હોય તેવી જંતુનાશક દવાઓનો ઉપયોગ કરે છે, જે પાક માટે યોગ્ય પણ ન હોય. આ અંગેની સાચી માહિતી આપવા માટે તેમજ મગફળીના પાકના રક્ષણ માટે ખેડૂતોને જાગૃત અને શિક્ષિત કરવાના ઉદ્દેશથી આ પ્રકાશનમાં મગફળીના પાકની સુરક્ષા માટે જંતુનાશક દવાઓની સૂચિ તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ નોંધાયેલ જંતુનાશકો સિવાય, ભારતીય કૃષિ સંશોધન પરિષદ અને રાજ્ય કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલયો દ્વારા ભલામણ કરેલ જંતુનાશકોની યાદી આપવાના પ્રયત્નો પણ કરવામાં આવ્યો છે.

૧. પાનના રોગો



ગોઝ

વહેલા આવતા પાનના ટપકાનો રોગ

મોડા આવતા પાનના ટપકાનો રોગ

અલ્ટરનેટીયા દ્વારા પાનનો સુકારો

રોગ	જંતુનાશક	માત્રા			છંટકાવ માટે પાણીનું પ્રમાણ (લી./હેક્ટર)	પ્રતીક્રિયા સમય (દિવસ)
		સક્રિય તત્વ (ગ્રા./હેક્ટર)	દવા ની માત્રા (ગ્રા. અથવા મિ.લી./હેક્ટર)			
ગોઝ	બિટરેટોનોલ ૨૫ ડબલ્યુપી	૨૫૦	૧૦૦૦		૫૦૦	૩૦
	કલોરોથેલોનીલ ૭૫ ડબલ્યુપી	૦.૬૬-૦.૮૬૩	૦.૮૭૫-૧.૫૦		૬૦૦-૮૦૦	૧૪
	મેન્કોઝેબ ૭૫ ડબલ્યુપી	૧૧૨૫-૧૫૦૦	૧૫૦૦-૨૦૦૦		૭૫૦	
	પ્રોપિકોનાઝોલ ૨૫ થંસી	૧૨૫	૫૦૦		૭૫૦	૧૫
	ટેબ્યુકોનાઝોલ ૨૫.૬ થંસી	૧૨૫-૧૮૮	૫૦૦-૭૫૦		૫૦૦	૪૮
	ટેબ્યુકોનાઝોલ ૨૫ ડબલ્યુજી	૧૨૫-૧૮૮	૫૦૦-૭૫૦		૫૦૦	૨૨
	ઇમિડાકલોપ્રિડ ૧૮.૫ + હેકસાકોનાઝોલ ૧.૫ એક્યુએસ ★	૪૦	૨૦૦ મિ.લી./૧૦ કિલોગ્રામ બીજ			
	બિટરેટોનોલ ૨૫ ડબલ્યુપી	૨૫૦	૧૦૦૦		૫૦૦	૩૦
વહેલા અને મોડા આવતા પાન ના ટપકાનો રોગ (વહેલી અને મોડી આવતી ચીતરી)	કાર્બેન્ડાઝિમ ૫૦ ડબલ્યુપી	૧૧૨.૫	૨૨૫		૭૫૦	
	કલોરોથેલોનીલ ૭૫ ડબલ્યુપી	૦.૬૬-૦.૮૬૩	૦.૮૭૫-૧.૫૦		૬૦૦-૮૦૦	૧૪
	હેકસાકોનાઝોલ ૫ થંસી	૭૫	૧૫૦૦		૫૦૦	૩૦
	મેન્કોઝેબ ૭૫ ડબલ્યુપી	૧૧૨૫-૧૫૦૦	૧૫૦૦-૨૦૦૦		૭૫૦	

મોડા આવતા પાન ના ટપકાનો રોગ (મોડી આવતી ચીનરી)	મેડિશન ૭૦ ડબલ્યુજી	૧૪૦૦	૨૦૦૦	૫૦૦-૭૫૦	૧૬
	પ્રોપિકોનાઝોલ ૨૫ ઇંસી	૧૨૫	૫૦૦	૭૫૦	૧૫
	પાયરીકલોસ્ટ્રોબિન ૨૦ ડબલ્યુજી	૧૦૦	૫૦૦	૫૦૦	૨૯
	સલ્ફર ૪૦ ડબલ્યુપી	૨૨૫૦-૩૦૦૦	૫૬૫૦-૭૫૦૦	૭૫૦-૧૦૦૦	
	સલ્ફર ૮૦ ડબલ્યુપી	૨૦૦૦-૪૦૦૦	૨૫૦૦-૫૦૦૦	૭૫૦-૧૦૦૦	
	સલ્ફર ૮૫ ડીપી	૧૨૭૫૦-૧૭૦૦૦	૧૫૦૦૦-૨૦૦૦૦		
	ટેબ્યુકોનાઝોલ ૨૫.૬ એસી	૧૨૫-૧૮૮	૫૦૦-૭૫૦	૫૦૦	૪૯
	ટેબ્યુકોનાઝોલ ૨૫ ડબલ્યુજી	૧૨૫-૧૮૮	૫૦૦-૭૫૦	૫૦૦	૨૨
	કાર્બેન્ડાઝિમ ૧૨ + મેન્કોઝેબ ૬૩ ડબલ્યુપી	૩૭૫	૫૦૦	૫૦૦	૭૨
	કાર્બેન્ડાઝિમ ૧૨ + મેન્કોઝેબ ૬૩ ડબલ્યુપી ★	૧.૮૮ ગ્રામ/૧૦ કિલો ગ્રામ બીજ	૨.૫ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ	૫૦૦	૩૦
	કાર્બેન્ડાઝિમ ૨૫ + મેન્કોઝેબ ૫૦ ડબલ્યુએસ ★	૨૨.૫-૨૬.૨૫ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ	૩૦-૩૫ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ	૦.૧	
	કાર્બેન્ડાઝિમ ૨૫ + ફલુપીવાઝોલ ૧૨.૫ એસઇ	૨૪૦-૩૦૦	૬૪૦-૮૦૦	૫૦૦	૨૪
	ફલુકસાઇડ ૧૬.૭ ગ્રામ/લી. + પાયરાકલોસ્ટ્રોબિન ૩૩૩ ગ્રામ લી. એસસી	૧૫૦	૩૦૦	૫૦૦	૨૦
	ઇમિડાઝોપ્રિડ ૧૮.૫ + હેકસાકોનાઝોલ ૧.૫ એફએસ ★	૪૦	૨૦૦ મિ.લી./૧૦ કિલોગ્રામ બીજ		

મોડા આવતા પાન ના ટપકાનો રોગ (મોડી આવતી ચીનરી)	મેન્કોઝેબ ૬૩ + કાર્બેન્ડાઝિમ ૧૨ ડબલ્યુએસ ★	૧૮.૮ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ	૨૫ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ		
	ટેબ્યુકોનાઝોલ ફલોરોસેન્સ ૦.૫ ડબલ્યુપી (ટીએનએચ પ્રજાતી નંબર આઈડીસીસી બીઇ૦૦૦૫) ★	૨૨.૫-૨૬.૨૫ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ	૧૦૦ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ અથવા ૧ કિલોગ્રામ/હેક્ટર		
	ટેબ્યુકોનાઝોલ ફલુરોસેન્સ ૧.૫ એએસ (પ્રજાતી નંબર એમટીસીસી ૨૫૩૮) ★		૧૦૦ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ ૧ લી./હેક્ટર		

અલ્ટરનેટીવા ક્રાશ પાનનો સુકારો માટે ભલામણ કરેલા જંતુનાશક : પ્રોપિકોનાઝોલ ૨૫ ઇંસી ૧ મિ.લી/લી. અથવા હેકસાકોનાઝોલ ૫ ઇંસી ૧ મિ.લી./લી. અથવા ટેબ્યુકોનાઝોલ ૨૫.૬ ઇંસી ૧.૫ મિ.લી./લી. ★ બીજ માવજત

૨. જમીન જન્ય રોગો



કંઠનો સુકારો




થડનો સુકારો



મૂળનો સુકારો



ફ્યુઝેરીયમ થી થતો સુકારો



અફલાટોક્સિન

રોગ	જંતુનાશક	માત્રા		છંટકાવ માટે પાણીનું પ્રમાણ (લી./હેક્ટર)	પ્રતીક્ષા સમય (દિવસ)
		સક્રિય તત્વ (ગ્રા./હેક્ટર)	દવા ની માત્રા (ગ્રા. અથવા મિ.લી./હેક્ટર)		
કંઠનો સુકારો	મેન્કોઝેબ ૭૫ ડબલ્યુપી ★	૧૮.૭૫-૨૨.૫૦ ગ્રામ ૧૦ કિલોગ્રામ બીજ	૨૫-૩૦ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ	૦.૧ (સ્લરી)	
	ટેબ્યુકોનાઝોલ ૫૪ એફએસ ★	૦.૨૪ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ	૪ મિ.લી./૧૦ કિલોગ્રામ બીજ		
	થાયરમ ૭૫ ડબલ્યુએસ ★	૩૩.૫ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ	૫૦ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ	૧	૭-૧૦
	કાર્બેન્ડાઝિમ ૧૨ + મેન્કોઝેબ ૬૩ ડબલ્યુપી ★	૧.૮૮ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ	૨.૫ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ		
	કાર્બેન્ડાઝિમ ૨૫ + મેન્કોઝેબ ૫૦ ડબલ્યુએસ ★	૨૨.૫-૨૬.૨૫ ગ્રામ/ ૧૦ કિલોગ્રામ બીજ	૩૦-૩૫ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ	૦.૧	
	કાર્બોક્ષીન ૩૩.૫ + થાયરમ ૩૩.૫ ડીએસ ★	૨૨.૫ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ	૩૦ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ		૬૦
	ઇમિડાક્લોપ્રિડ ૧૮.૫ + હેકસાકોનાઝોલ ૧.૫ એફએસ ★	૪૦	૨૦૦ મિ.લી/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ		
	મેન્કોઝેબ ૬૩ + કાર્બેન્ડાઝિમ ૧૨ ડબલ્યુએસ ★	૧૮.૮ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ	૨૫ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ		

મુદત સુકારો	ટેબ્યુકોનાઓલ ૨ ડીએસ ★		૨૦૦-૨૫૦ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ	૧૦-૧૨.૫ લી./૧૦ કિલોગ્રામ બીજ			
	ટેબ્યુકોનાઓલ ૫૪ એફએસ ★	૦.૨૪ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ	૪ મિ.લી./૧૦ કિલોગ્રામ બીજ				
મૂળનો સુકારો	કાર્બેન્ડાઝિમ ૨૫ + ફલુપીલાઓલ ૧૨.૫ એસઈ	૨૪૦-૩૦૦	૬૪૦-૮૦૦	૫૦૦	૨૪		
	કાર્બોક્ષીન ૩૭.૫ + થાયરમ ૩૭.૫ ડીએસ ★	૨૨.૫ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ	૩૦ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ		૬૦		
	ઇમિડાઝોલિડ ૧૮.૫ + હેકસાકોનાઓલ ૧.૫ એફએસ ★	૪૦	૨૦૦ મિ.લી./૧૦ કિલોગ્રામ બીજ				
	થાઇમોફેનેટ મીથાઇલ ૪૫૦ ગ્રામ/લી. + પાયરીકલોસ્ટ્રોબિન ૫૦ ગ્રામ/લી. એફએસ ★	૧૦-૧૨.૫ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ	૨૦-૨૫ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ				
	ટેબ્યુકોનાઓલ ૨ ડીએસ ★	૨૦૦-૨૫૦ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ	૧૦-૧૨.૫ લી./૧૦ કિલોગ્રામ બીજ				
મૂળનો સુકારો	કાર્બેન્ડાઝિમ ૧૨ + મેન્કોઝેબ ૬૩ ડબલ્યુપી ★	૧.૮૮ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ	૨.૫ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ				
	કાર્બેન્ડાઝિમ ૨૫ + મેન્કોઝેબ ૫૦ ડબલ્યુએસ ★	૨૨.૫-૨૬.૨૫ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ	૩૦-૩૫ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ	૦.૧			
	કાર્બોક્ષીન ૩૭.૫ + થાયરમ ૩૭.૫ ડીએસ ★	૨૨.૫ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ	૩૦ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ		૬૦		
	મેન્કોઝેબ ૬૩ + કાર્બેન્ડાઝિમ ૧૨ ડબલ્યુએસ ★	૧૮.૮ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ	૨૫ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ				
	ટેબ્યુકોનાઓલ ૫૪ એફએસ ★	૦.૨૪ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ	૪ એમએલ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ				
બીજ અને ઓલ સડરું	પેનકેલુફેન ૧૩.૨૮ + ટ્રાઇકલોક્ષીટ્રોબિન ૧૩.૨૮ એફએસ ★	૨૪.૬-૩૦.૮ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ	૮૦-૧૦૦ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ				
	કાર્બોક્ષીન ૩૭.૫ + થાયરમ ૩૭.૫ ડીએસ ★	૨૨.૫ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ	૩૦ ગ્રામ/૧૦ કિલોગ્રામ બીજ		૬૦		

કિપરોક્ત નોંધાયેલ જંતુનાશકો સિવાય, જમીન જન્ય રોગોને પણ નીચેની ભલામણો દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવે છે.

● બીજ ને વાવતા પહેલા ટ્રાઇકોડીમ હાઇડ્રોક્સીપ્રોપાઇલ ટ્રાઇકોડીમ વીરીડી ૧૦ ગ્રામ/કિલોગ્રામ બીજ ૫૮ આપવો તથા ટ્રાઇકોડીમ પ્રજાતિઓ ૪ કિલોગ્રામ ને ૨૫૦ કિલોગ્રામ ગળનીયા ટાણીયા ખાતરમાં અથવા ૨૦૦ કિલોગ્રામ એરેડીના ખોળમાં ભેળવીને વાવતા પહેલા જમીનમાં આપવાથી, બીજ તેમજ જમીન જન્ય રોગોનું નિયંત્રણ કરી શકાય છે.

★ બીજ માટે


૩. વિષાણુ જન્ય રોગો



મગફળીનો અગ્રકલીકાનો સુકારો

શિપ્સ માટે નોંધાયેલ જંતુનાશકો એ રોગ માટે પણ કામ કરે છે. કારણ કે શિપ્સ વિષાણુનું સંક્રામિત કરે છે.


૪. ચુસીયા પ્રકારની અવાતો



શીપ્સ



મોલો-મશી



તડતડીયા




અવાત	જંતુનાશક	માત્રા			પ્રતીક્ષા સમય (દિવસ)
		સક્રિય તત્વ (ગ્રા./હેકટર)	દવા ની માત્રા (ગ્રા. અથવા મિ.લી./હેકટર)	છંટકાવ માટે પાણીનું પ્રમાણ (લી./હેકટર)	
શીપ્સ (ક્ષમ્યમાત્રા : રોપ અવસ્થામાં ૫ શીપ્સ પ્રતિ ફુપળ)	લેબડા-સાયલોથિન ૫ ઇસી	૧૦-૧૫	૨૦૦-૩૦૦	૪૦૦-૫૦૦	૧૦
	કવીનાફોસ ૨૫ ઇસી	૩૫૦	૧૪૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	૩૦
	ઇમીડાક્લોપ્રીડ ૧૮.૫ + હેક્ષાકોનામોલ ૧.૫ એફએસ	૪૦	૨૦૦		
મોલો-મશી (ક્ષમ્યમાત્રા : રોપ અવસ્થા ૫ થી ૧૦ મોલો પ્રતિ છોડ)	એન્ડોસલ્ફાન ૪ ડીપી	૧૪૦-૧૭૫	૩૫૦૦-૪૪૦૦		૨૧
	ઇમીડાક્લોપ્રીડ ૧૭.૮ એસએલ	૨૦-૨૫	૧૦૦-૧૨૫	૫૦૦	૪૦
તડતડીયા	ઇમીડાક્લોપ્રીડ ૧૭.૮ એસએલ	૨૦-૨૫	૧૦૦-૧૨૫	૫૦૦	૪૦

(ક્ષમ્યમાત્રા: ૩૦ દિવસનો પાક થાય ત્યારે ૫ થી ૧૦ પુખ્ત તડતડીયા પ્રતિ છોડ)	લેમ્ડા-સાયલોથિન ૫ ઇંસી કવીનાલ્ફોસ ૨૫ ઇંસી ઇમીડાકલોપ્રીડ ૧૮.૫ + હેક્ષાકોનાઝોલ ૧.૫ એફએસ થાયોમિથોકઝામ ૧૨.૬ લેમ્ડા- સાયલોથિન ૬.૫ ઇંસી	૧૦-૧૫ ૩૫૦ ૪૦ ૨૭.૫	૨૦૦-૩૦૦ ૧,૪૦૦ ૨૦૦ ૧૫૦	૪૦૦-૫૦૦ ૫૦૦-૧૦૦૦ ૫૦૦	૧૦ ૩૦ ૨૮
--	--	----------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------

ઉપરોક્ત નોંધાયેલ જંતુનાશકો સિવાય, ચુસીયા પ્રકારની જીવાતોને પણ નીચેની ભલામણો દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવે છે.

- લીકેનિસિલિથમ લેકેની નામની ફૂગનો છંટકાવ ૫ ગ્રામ/લીટર પ્રમાણે પાણીમાં ઓગાળીને સાંજના સમયે છંટકાવ કરવો.
- ડાઇમેથોએટ ૩૦ ઇંસી ૨ મિ.લી./લીટર અથવા મોનોક્રોટોફોસ ૩૬ એસએલ ૨.૫ મિ.લી./લીટર અથવા ઇમીડાકલોપ્રીડ ૧૭.૮ એસએલ ૦.૩ મિ.લી./લીટર અથવા થાયોકલોપ્રીડ ૪૮૦ એસસી ૦.૩ મિ.લી./લીટર અથવા થાયોમિથોકઝામ ૨૫ ડબલ્યુ ૦.૨ ગ્રામ/લીટર અથવા એસીટામિપ્રીડ ૨૦ એસપી ૦.૨ ગ્રામ/લીટર પ્રમાણે પાણીમાં નાખીને કોઇપણ એક દવાનો છંટકાવ, પાક ૨૫ થી ૩૦ દિવસનો થાય ત્યારે કરવો.

૫. પાન ખાનારી જીવાતો



પાન કોરીયું

લક્ષ્મી ઇયળ

ભાલ કાતરા ઇયળ

પાન કોરીયું (ક્ષમ્યમાત્રા: પાક ૩૦ દિવસ નો થાય ત્યાં સુધીમાં પાંદડા પર ૫ પોલાણ/છોડ)	ડેલ્ટામેથીન ૨.૮ ઇંસી લેમ્ડા-સાયલોથિન ૫ ઇંસી ફેરિટ ૧૦ સીજી કવીનાલ્ફોસ ૨૫ ઇંસી	૧૨.૫ ૧૦-૧૫ ૧૫૦૦ ૩૫૦	૫૦૦ ૨૦૦-૩૦૦ ૧૫૦૦૦ ૧૪૦૦	૪૦૦-૬૦૦ ૪૦૦-૫૦૦ ૫૦૦-૧૦૦૦ ૫૦૦	૧ ૧૦ ૩૦ ૭
લક્ષ્મી ઇયળ (ક્ષમ્યમાત્રા: પાક ૩૦ દિવસ નો થાય ત્યાં સુધીમાં ૨૦-૨૫% પાનનું જીવાતના નુકશાનને લીધે ખરી જાયું)	મીથામિલ ૪૦ એસપી કવીનાલ્ફોસ ૨૦ એએફ થાયોમિથોકઝામ ૧૨.૬ + લેમ્ડા- સાયલોથિન ૬.૫ ઇંસી	૩૦૦-૩૫૦ ૨૫૦-૩૭૫ ૨૭.૫	૭૫૦-૮૫૦ ૧૨૫૦-૧૭૭૫ ૧૫૦	૭૫૦-૧૦૦૦ ૭૫૦-૧૦૦૦ ૫૦૦	૩૦ ૩૮ ૨૮

જાવાત	જંતુનાશક	માત્રા		છંટકાવ માટે પાણીનું પ્રમાણ (લી./હેક્ટર)	પ્રતીક્ષા સમય (દિવસ)
		સક્રિય તત્વ (ગ્રા./હેક્ટર)	દવા ની માત્રા (ગ્રા. અથવા મિ.લી./હેક્ટર)		
લાલ કાતરા ઇયળ	ડાયકલોરોવોસ ૭૬ ઇંસી	૩૭૫-૭૫૦	૪૭૦-૯૪૦	૫૦૦-૧૦૦૦	
(ક્ષમ્યમાત્રા : પાક ૩૦ દિવસ નો થાય ત્યાં)	ટ્રાઇકલોરફોન ૫ જીઆર અથવા ૫ ડી અથવા ૫૦ ઇંસી	૫૦૦			
સુધીમાં ૨૦-૨૫% પાનનું જાવાતના નુકશાનને લીધે ખરી જવું)	થાયોમિથોકઝામ ૧૨.૬ + લેમ્ડા-સાયલોથ્રિન ૯.૫ ઇંસી	૨૭.૫	૧૫૦	૫૦૦	૨૮

ઉપરોક્ત નોંધાયેલ જંતુનાશકો સિવાય, પાન ખાનારી જાવાતોને પણ નીચેની ભલામણો દ્વારા નિયંત્રીત કરવામાં આવે છે.

- ટ્રાઇકોગ્રામા ચીલોનીસ અને ટીલોનોમસ રેમસ જેવા પરભક્ષી ૫૦,૦૦૦/હેક્ટર પ્રમાણે ૭ થી ૧૦ દિવસના અંતરે બે વખત છોડવા તેમજ બ્રેકોન હેબેટોર ૫,૦૦૦/હેક્ટર પ્રમાણે ૭ થી ૧૦ દિવસના અંતરે બે વખત ખેતરમાં છોડવા.
- લશ્કરી ઇયળ નિયંત્રણ માટે બજારમાં મળતા ન્યુક્લીયર પોલીહાઇડ્રોસીસ નામના વિષાણુ નું દ્રાવણ ૪ મિ.લી./૧૦ લીટર પાણીમાં, તેમજ કાતરા ઇયળોના નિયંત્રણ માટે બજારમાં મળતા ગ્રેન્યુલોસિસ વિષાણુ નું દ્રાવણ ૩ મિ.લી./૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળીને સાંજના સમયે છંટકાવ કરવો.
- બજારમાં મળતા બેસીલસ થુરીનજીએનસીસ તથા બીવેરીયા બેઝીયાના તથા મેટરિજીયમ રીલેઇ નામના જાવાણુના પાવડરનો ૨ ગ્રામ/લીટર પ્રમાણે પાણીમાં ઓગાળીને સાંજના સમયે છંટકાવ કરવો.
- લીંબોળીનું તેલ ૫ મિ.લી./લીટર તથા સાબુનો પાવડર ૧ ગ્રામ/લીટર પ્રમાણે પાણીમાં નાખીને અથવા ૫% લીંબોળીના બીજનો અર્ક નો છંટકાવ કરવો.
- કલોરોપાયરીફોસ ૨૦ ઇંસી ૨.૫ મિ.લી./લીટર અથવા પ્રોફેનોફોસ ૫૦ ઇંસી ૨ મિ.લી./લીટર અથવા નોવાલ્યુરોન ૧૦ ઇંસી ૧ મિ.લી./લીટર અથવા સ્પીનોસેડ ૪૫ એસસી ૦.૩ મિ.લી./લીટર પ્રમાણે પાણીમાં નાખીને કોઈ પણ એક દવાનો છંટકાવ કરવો.
- લશ્કરી ઇયળોના નિયંત્રણ માટે કમોદનું ભૂસુ ૧૨.૫ કિલોગ્રામ + ગોળની રસી/ગોળ ૨.૫ કિલોગ્રામ + કાર્બારીલ ૫૦ ડબલ્યુપી ૧.૨૫ કિલોગ્રામ મુજબ લઈને તેને બરાબર ભેળવી પ્રલોભીકા બનાવીને ખેતરમાં છંટકાવ કરવો.

૬. જમીનમાં રહીને નુકશાન કરતી જાવાતો



સફેદ ઘેણ/મૂંડો




ઊઘઈ

સફેદ ઘેણ/મૂંડો (ક્ષમ્યમાત્રા: ૧ ચોરસ મીટર વિસ્તારમાં ૧ ઇંચળ)	કાર્બોફ્યુરેન ૩ સીજી	૧૫૦૦	૫૦૦૦૦		
	ફોરેટ ૧૦ સીજી	૨૫૦૦	૨૫૦૦૦		
ઊધઈ	થાયોમિથોકઝામ ૭૫ એસજી	૯૪	૧૨૫		
	ઇમીડાકલોપ્રીડ ૧૮.૫ + હેક્ષાકોનાઝોલ ૧.૫ એફએસ	૪૦	૨૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	૫૭
ડોડવા ખાનાર ઇંચળ	કાર્બોફ્યુરેન ૩ સીજી	૧૦૦૦	૩૩૩૦૦		

ઉપરોક્ત નોંધાયેલ જંતુનાશકો સિવાય, સફેદ ઘેણ/મૂંડો ને પણ નીચેની ભલામણો દ્વારા નિયંત્રીત કરવામાં આવે છે.

- સંધ્યા સમયે ૭ થી ૧૦ વાગ્યા સુધી એક પ્રકાર પિંજર/હેક્ટર પ્રથમ સારા વરસાદ બાદ ખેતરમાં મુકવું.
- જમીનમાંથી પુખ્ત બહાર આવે એટલે કે પ્રથમ વરસાદ પછી શેઢે પાળે આવેલા યજમાન ઝાડ પર ૩ ફેરોમોન પીંજર/ઝાડ/૧૫ મીટરના ઘેરાવા પ્રમાણે લગાવીને તેના પુખ્ત ફીટકો પકડીને તેનો નાશ કરવો.
- શેઢા પાળા પરના વૃક્ષો પર ઇમીડાકલોપ્રીડ ૧૭.૮ એસએલ નું ૧.૫ મિ.લી./લીટર અથવા મોનોક્રોટોફોસ ૩૬ એસએલનું ૧.૬ મિ.લી./લીટર સાંદ્રતાવાળા દ્રાવણનો છંટકાવ સાંજના સમયે કરવો જોઈએ.
- પાક વાવતા પહેલા કાર્બોફ્યુરેન ૩ સીજી ૩૦ કિલોગ્રામ/હેક્ટર અથવા ફોરેટ ૧૦ સીજી ૨૫ કિલોગ્રામ/હેક્ટર પ્રમાણે ચાસમાં આપવું/વાવવું.
- પાક વાવતા પહેલા થાયોમેથોક્ઝામ ૨૫ ડબલ્યુએસ ૧.૯ લી./હેક્ટર અથવા ફીપ્રોનીલ ૫ એફએસ લી./હેક્ટર પ્રમાણે ચાસમાં રેડવું.
- મગફળીના બીજને કલોરોપાયરીફોસ ૨૦ ઇસી ૬.૫ થી ૧૨.૦ મિ.લી./કિલોગ્રામ બીજ પ્રમાણે પટ આપવો.

૭. સંગ્રહ સ્થાનની જવાબદારી



ભોટવા

સંગ્રહ દરમિયાન મગફળીમાં ભોટવાના સંચાલન માટે કોઈ નોંધાયેલ જંતુનાશકો નથી; જો કે નીચેની ભલામણો ઉપલબ્ધ છે.

- સંગ્રહ સ્થાનની દીવાલો, છત અને તળિયા અથવા જો મગફળી શણના કોથળામાં ભરી હોય તો આવા કોથળા પર માણસો માટે ઓછી નુકસાન કારક દવાઓ જેવી કે ડેલ્ટામેથ્રીન ૨.૫ ઇસી ૦.૫ મિ.લી./લીટર પાણીમાં અથવા મેલાથીઓન ૫૦ ઇસી ૫ મિ.લી./લીટર ઓગાળીને છંટકાવ કરવો જોઈએ.
- તેમજ મગફળીનો સંગ્રહ કર્યા બાદ એલ્યુમીનીયમ ફોસ્ફાઇડ ૫૬% નું ૧૦ ગ્રામ વજનનું એક પાઉચ પ્રતિ ૧ ટન મગફળી મુજબ મુકીને હવાચુસ્ત બંધ કરીને ધુમ્કરણ કરવું.

૮. ઉંદરો

- ઉંદરોનાં નિયંત્રણ માટે નોંધાયેલ ઉંદર નાશક દવા ઓમાડીયોલોન ૦.૨૫ સીબી (૦.૦૦૫ ગ્રામ/હેક્ટર) અથવા ઓમાડીયોલોન ૦.૦૦૫ આરબી (૦.૦૦૫ ગ્રામ/હેક્ટર) સાથે મિશ્રિત કરી ખોરાક સાંજના સમયે ખેતરમાં ૫ થી ૧૦ દિવસ મૂકો.

૯. સૂત્રફૂમી



મુળ-ગાંઠના સૂત્રફૂમી



મુળ-જખમના સૂત્રફૂમી



કાલહસ્તી બીમારી

મગફળીમાં સૂત્રફૂમિના સંચાલન માટે નોંધાયેલા જંતુનાશકો નથી; જે કે, નીચેની ભલામણો ઉપલબ્ધ છે.

- જે વિસ્તારમાં સૂત્રફૂમિનો ઉપદ્રવ ખૂબ જ વધારે હોય ત્યાં વાવેતરના ૭ દિવસ પહેલાં ચાસમાં લીમડાનો અથવા એરંડીનો ખોળ ૧ ટન/હેક્ટર અથવા કાર્બોફ્યુરાન ૩૩.૦ સીજી કિલોગ્રામ/હેક્ટર જમીનમાં આપવાનું હોય.
- કાર્બોસલ્ફાન ૨૫ ડીએસ ૩ ગ્રામ/કિલોગ્રામના દર પ્રમાણે બીજને ૫૮ આપવો.

૧૦. નીંદણ

પ્રકાર	ઘાસ-નીંદણનાશક	માત્રા		ઠંટકાવ માટે પાણીનું પ્રમાણ (લી./હેક્ટર)	પ્રતીક્ષા સમય (દિવસ)	નોંધ
		સક્રિય તત્વ (ગ્રા./હેક્ટર)	દવાની માત્રા (ગ્રા. અથવા મિ.લી./હેક્ટર)			
બીજનું સ્ફૂરણ થયા પહેલાં	એલાકલોર ૫૦ ઇંસી	૧૫૦૦-૨૫૦૦	૩૦૦૦-૫૦૦૦	૨૫૦-૫૦૦	૧૨૦-૧૫૦	ઘાસ અને મોટા પાંદડાવાળા નીંદણ
	અલાકલોર ૧૦ જીઆર	૧૫૦૦-૨૫૦૦	૧૫૦૦૦-૨૫૦૦૦			
	ડાઇકલોસુલામ ૮૪ ડબલ્યુડીજી	૨૨-૨૬	૨૬.૨-૩૦.૯		૭૭	મોટા પાંદડાવાળા નીંદણ
	ઓક્સીફલોરફેન ૨૩.૫ ઇંસી	૧૦૦-૨૦૦	૪૨૫-૮૫૦	૫૦૦-૭૫૦		ઘાસ
બીજનું સ્ફૂરણ થયા પછીથી	ઇમિનેથાપાઇર ૧૦ એસએલ	૧૦૦-૧૫૦	૧૦૦૦-૧૫૦૦	૫૦૦-૭૦૦	૯૦	ઘાસ અને મોટા પાંદડાવાળા નીંદણ
	ઇમિનેથાપાઇર ૧૦ એસએલ + સરફેક્ટન્ટ	૧૦૦-૧૫૦ + ૨ મિ.લી./લી.	૧૦૦૦-૧૫૦૦ + ૨૦ મિ.લી./લી.	૩૭૫	૧૦૨	
	ફ્લુઝીફોપ-પી-બ્યૂટાઇલ ૧૧.૧ + ફોમેસાફેન ૧૧.૧ એસએલ	૨૫૦	૧૦૦૦	૫૦૦	૮૨	ઘાસ બારમાસી ઘાસ
	ઓક્સીફલોરફેન ૨૩.૫ ઇંસી	૧૦૦-૨૦૦	૪૨૫-૮૫૦	૫૦૦-૭૫૦		
	કિવલોક્ષોપ-ઇથાઇલ ૫ ઇંસી	૩૭.૫-૫૦	૭૫૦-૧૦૦૦	૫૦૦	૮૯	
	ઇમિનેથાપાઇર ૩૫ + ઇમાઝામોક્ષ ૩૫ ડબલ્યુજી + સરફેક્ટન્ટ	૭૦ + ૨ મિ.લી./લી.	૧૦૦ + ૨ મિ.લી./લી.	૩૭૫-૫૦૦	૮૩	સાંકડું અને મોટા પાંદડાવાળા નીંદણ

ઉપરોક્ત મોંઘાવેલ ઘાસ-નીંદામણ નાશકો સિવાય નીચેની ભલામણો દ્વારા પણ નીંદણ સંચાલિત થાય છે.

બીજ વાણી પહેલાં મોટીમાં સમાવિષ્ટ કરવું હોય	ફંચુકલોરલિન ૪૫ ઇંસી	૭૫૦-૧૦૦૦	૧૬૭૦-૨૨૨૦	૫૦૦-૬૦૦	૮૦-૧૮૦	ઘાસ અને કેટલાક મોટા પાંદડાવાળા નીંદણ
	ટ્રાઇફલુરલિન ૪૮ ઇંસી	૭૫૦-૧૦૦૦	૧૫૬૦-૨૦૮૦	૫૦૦-૬૦૦	૮૦-૩૬૦	
બીજનું સ્ફૂરણ થયા પહેલાં	પેન્ડીમેથીલીન ૩૦ ઇંસી	૭૫૦-૧૦૦૦	૨૫૦૦-૩૩૦૦	૫૦૦-૬૦૦	૬૦-૨૦૦	ઘાસ અને કેટલાક મોટા પાંદડાવાળા નીંદણ
	બુટાકલોર ૫૦ ઇંસી	૭૫૦-૧૦૦૦	૧૫૦૦-૨૦૦૦	૫૦૦-૬૦૦	૧૦૦	
	મેટોલાકલોર ૫૦ ઇંસી	૭૫૦-૧૦૦૦	૧૫૦૦-૨૦૦૦	૫૦૦-૬૦૦	૪૦-૧૮૦	
	થાયોબેનકાર્બ ૫૦ ઇંસી	૭૫૦-૧૦૦૦	૧૫૦૦-૨૦૦૦	૫૦૦-૬૦૦	૩૦-૬૦	
	ઓક્ષાડિયાળેન ૨૫ ઇંસી	૭૫૦-૧૦૦૦	૩૦૦૦-૪૦૦૦	૫૦૦-૬૦૦	૫૬-૧૨૫	
	એનીલોફોસ ૩૦ ઇંસી	૫૦૦	૧૬૭૦	૫૦૦-૬૦૦	-	
બીજનું સ્ફૂરણ થયા પછીથી	ફંચુકલોર-પી-બ્યૂટાઇલ ૧૩.૪ ઇંસી	૨૫૦	૧૮૬૦	૫૦૦-૬૦૦	૩૦-૮૦	ઘાસ, કેટલાક મોટા પાંદડાવાળા નીંદણ બારમાસી ઘાસ
	ડાઇકલોફોપ-મીથાઇલ ૨૮ ઇંસી	૭૫૦-૧૦૦૦	૨૬૮૦-૩૫૭૦	૫૦૦-૬૦૦	૩૦	

નીચે ઉલ્લેખિત જંતુનાશકો દેશમાં ઉપયોગ માટે પ્રતિબંધિત છે :

જંતુનાશક	પ્રતિબંધોની વિગતો
એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફાઇડ	સરકારના વનસ્પતિ સુરક્ષા સલાહકાર દ્વારા અધિકૃત પ્રમાણિત જંતુ નિયંત્રણ સંચાલકોની દેખરેખ હેઠળ જ ઉપયોગ કરવો.
કેપ્ટફોળ	માત્ર બીજ ટ્રેસર તરીકે ઉપયોગ કરો.
સાઇપરમેથિન ૩% ધુમાડો જનરેટર	જંતુ નિયંત્રણ સંચાલકો દ્વારા જ ઉપયોગ કરવો અને સામાન્ય લોકો દ્વારા તેનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી નથી.
ડેબેમેટ	થા-વાડીમાં ઉપયોગ માટે મંજૂરી નથી.
ડાઇકલોરોડાઇફીનાઇલ ટ્રાઇકલોરઇથેન (ડીટીટી)	કૃષિ ઉપયોગથી ખાટો ખેતી લીધો છે, પરંતુ તેનો ઉપયોગ ફક્ત આરોગ્ય કાર્યક્રમોમાં જ થઈ શકે છે.
ફેનિતરોલીઓન	ફક્ત અનુસૂચિત રણના વિસ્તારમાં તીડના નિયંત્રણ માટે અને સાર્વજનિક સ્વાસ્થ્યમાં વપરાય છે.
મિથાઇલ ઓમાઇડ	સરકારના વનસ્પતિ સુરક્ષા સલાહકાર દ્વારા અધિકૃત પ્રમાણિત જંતુ નિયંત્રણ સંચાલકોની દેખરેખ હેઠળ જ ઉપયોગ કરવો.
મોનોક્રોટાફોસ	શાકભાજી પર વાપરવા પર પ્રતિબંધ છે.
ટ્રાઇફલુરલિન	માત્ર થઈ પર વાપરો.

નીચે જણાવેલ જંતુનાશકો ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦ સુધીમાં તબક્કાવાર વંદા થવાની છે :

એલાકલોર, ડાઇકલોરવોસ, ફોરેટ, ફોસ્ફેમિડોન, ટ્રાઇઓક્સ અને ટ્રાઇકલોરેન પર ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦ થી સંપૂર્ણ રીતે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે. આ છ જંતુનાશકોનો હવે ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦ પછી ઉપયોગ કરી શકાશે નહીં.

જંતુનાશક દવા વાપરતી વખતે શું કરવું અને શું ન કરવું.

શું કરવું :

- જરૂરિયાત આધારિત જંતુનાશકોનો ઉપયોગ કરો.
- ફંકત નોંધાયેલું જંતુનાશક અથવા ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદ અને રાજ્ય કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલયો દ્વારા ભલામણ કરેલ જંતુનાશકો નો જ ઉપયોગ કરો.
- જંતુનાશક દવાના લેખલ ઉપર લખેલી સૂચનાઓ અને સલામતી અંગેની ચેતવણીઓ વાંચો અને તેનું પાલન કરો.
- ભલામણ કરેલ જંતુનાશકોની માત્રા અને છંટકાવ માટે પાણીનું પ્રમાણ જાળવો.
- નામાંકિત સ્પ્રેઅર અને નોઝલનો ઉપયોગ કરો.
- દવાનું મિશ્રણ કર્યા પછી તરત જ દવાઓનો ઉપયોગ કરી નાંખવો.
- છાંટતી વખતે રક્ષણાત્મક વસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરો.
- જંતુનાશક છંટકાવની પ્રવૃત્તિના રેકૉર્ડ જાળવી રાખો.
- જંતુનાશક ડબ્બા/પેકિંગને સુરક્ષિત, ઠંડી જગ્યાએ અને બાળકોની પહોંચથી દૂર સંગ્રહ કરો.
- છંટકાવ માટે વપરાયેલી બધી સામગ્રી અને ડબ્બા/પેકિંગને પાણીથી સારી રીતે ધોઈ નાંખો.
- ઢોળાયેલી જંતુનાશક દવાને સાફ/દૂર કરવા માટે લાકડાનો વહેર, ચૂનો અને રેતીનો ઉપયોગ કરો.
- થોડા જ સમય માટે સમય પહેલા છાંટવામાં આવેલા દવાના વિસ્તારમાં પશુઓનો પ્રવેશ અટકાવો.
- કોઈ પણ કલેક્ટરી અથવા આકર્ષિતક ઝેરી અસરના નિવારણ માટે નેજકા ચિકિત્સકનો સંપર્ક કરો.
- જંતુનાશક ઝેરના હિસ્સામાં યોગ્ય પ્રાથમિક સારવાર આપવી.

શું ન કરવું :

- વિદ્યુત અસરવાળા જંતુનાશકોને ખાતરો અથવા સૂકા પોષકતત્વો સાથે મિશ્રિત કરશો નહીં.
- મૂળ ડબ્બા/પેકિંગમાંથી જંતુનાશક બીજા ડબ્બા/પેકિંગમાં સ્થળાંતરીત કરશો નહીં.
- જંતુનાશક ડબ્બા/પેકિંગને ખતરમાં અથવા જળાશયોમાં ફેંકશો નહીં.
- જંતુનાશક ડબ્બા/પેકિંગનો ફરીથી ઉપયોગ કરશો નહીં.
- દવા છાંટતી વખતે કોઈ વસ્તુ ન ખાવી અથવા ધુમ્રપાન ન કરવું.
- તંદુરસ્ત ન હોય ત્યારે જંતુનાશક દવાઓનો છંટકાવ કરવો નહીં.
- સમયસીમા સમાપ્ત થઈ ગયેલ હોય તેવા જંતુનાશકોનો ઉપયોગ કરશો નહીં.
- હાથ વડે જંતુનાશકો ભેળવવા નહીં.
- પવનની દિશા વિદ્યુત તેમજ વધુ પડતા સૂર્યતાપમાં જંતુનાશક દવાઓનો છંટકાવ ન કરવો.
- પાક પર વધુ પડતા જંતુનાશકનો છંટકાવ ન કરવો.
- ફલીનીકરણ માટે ઉપયોગી જંતુઓ પર ઝેરી અસર પડે તેવી જોખમી જંતુનાશક દવાઓનો છંટકાવ કરશો નહીં.
- પ્રતિક્ષા સમયવાળા પહેલા પાકને કાપશો કે લણશો નહીં.

મૂળ સ્ત્રોત :

૧. નટરાજ એમ. વી., કુલદીપસિંહ જાડેન, પ્રસન્ન હોલ્લાજર, થીરુમલાઈસામી પી. પી., ખૂનમ જસરોટીયા, રામ દત્તા અને સવાલીયા એસ. ડી. (૨૦૧૫) “મગફળી પાકમાં જીવાતો અને રોગોનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન” ભારતીય-મગફળી સંશોધન નિદેશાલય, પોસ્ટ બોક્ષ નં. -૦૫, જૂનાગઢ - ૩૬૨ ૦૦૧, ગુજરાત, ભારત, ટેકનીકલ બુલેટીન નંબર ૦૧/૨૦૧૫, પાનું ૧૯.
૨. કેન્દ્રીય જંતુનાશક મંડળ અને નોંધણી સમિતિ, ફરીફાલાઈ-૧૨૧૦૦૧ (<http://ppqs.gov.in/divisions/cib-rc>), વેબસાઈટ ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ ના રોજ વાંચી હતી)
૩. સૂચકૃતી વિભાગ, ભારતીય કૃષિ સંશોધન સંસ્થા, નવી દિલ્હી-૧૧૦૦૧૨ ના મુખ્ય સંશોધન સિધ્ધિઓ (<https://www.iair.res.in/>), વેબસાઈટ ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ ના રોજ વાંચી હતી)
૪. Jat R.S., Meena H. N., Singh A. L., Surya J.N. and Misra J. B. 2011. Weed management in groundnut (Arachis hypogaea L.) in India - A Review. *Agri. Reviews*, 32 (3): 155-171.

પ્રકાશક : ભારતીય - મગફળી સંશોધન નિદેશાલય,

ઈવનગર રોડ, પો.બો. નં. ૫, જૂનાગઢ-૩૬૨૦૦૧ ગુજરાત, ભારત.

વેબ સાઈટ : www.dgr.org.in, ઈ-મેલ : director.dgr@icar.gov.in, ટેલેફોન : +91 - 0285 - 2673041

પ્રિન્ટર્સ : આર્ટ ઇનિટિયા ઓફસેટ,

જૂનાગઢ. પો. ૯૮૭૮૫ ૪૧૨૭૫